

# SOBRE-ESTIMACIÓN DE ABORTO CLANDESTINO EN LATINOAMÉRICA

En la mayoría de los países latinoamericanos, el aborto electivo está prohibido por ley. Para conocer la magnitud de los abortos inducidos electivos, es necesario recurrir a estimaciones indirectas, cuya validez dependerá del tipo de metodología, su reproducibilidad y el error al que conllevan.



**Encuestas de auto-reporte** en mujeres en edad fértil, las cuales pueden conducir a subestimación variable, debido a que muchas mujeres tienden a ocultar o no declarar su aborto debido al estigma asociado.



**Encuestas de opinión a terceros**, las que presentan la mayor subjetividad dado a que están muy expuestas a sesgos de selección, memoria e ideología. Son de difícil reproducción y de cuestionable validez.



**Estimación epidemiológica**, basada en estadísticas vitales e información objetiva conocida de poblaciones estándar. Su error depende de la calidad e integridad de los registros oficiales y las diferencias entre poblaciones.

- Se seleccionan **no al azar** un número limitado de instituciones de salud donde un profesional responde la EIPS.
- Los números se basan en **"recuerdos"** de este profesional o en registros incompletos.
- La información se extrapola a todo el país.
- No se define "un mes típico" y se asume que el valor será constante durante 12 meses.
- En la EPCT, se seleccionan **no al azar** un número limitado de personas que opinan subjetivamente en base a sus creencias.
- Provee un factor de expansión **especulativo**.

Sesgos de selección y memoria

Sesgos de selección e ideología

$$\text{Cifra de EIPS} \times \text{Cifra de EPCT} = \text{Cifra estimada de abortos}$$

Ej.: 3.300 x 10 = 33.000

## ES MUY DIFÍCIL REPRODUCIR ESTE TIPO DE ESTIMACIONES Y ESTABLECER SU VALIDEZ CIENTÍFICA

Al estimar el número de abortos mediante métodos epidemiológicos en base a tasas reproductivas reconocidas internacionalmente y datos de estadísticas vitales de poblaciones estándar, se detectó una sobre-estimación significativa del número de abortos clandestinos en varios países latinoamericanos.

Cifra de abortos reportada por el Instituto Guttmacher: **446.998**




Cifra de abortos reportada por el Instituto Guttmacher: **160.000**



Cifra de abortos reportada por el Instituto Guttmacher: **400.400**




Cifra de abortos reportada por el Instituto Guttmacher: **64.954**



Cifra de abortos reportada por el Instituto Guttmacher: **271.000**



Cifra de abortos reportada por el Instituto Guttmacher: **82.000**



Durante más de 20 años, organizaciones privadas tales como el Instituto Guttmacher han reportado un **gran número** de abortos clandestinos en países latinoamericanos.

**Sin embargo, las metodologías de estimación empleadas por dichas instituciones se basan fundamentalmente en encuestas de opinión a terceros, las que poseen un margen de error muy amplio.**



**1. Encuesta a instituciones de salud (EIPS):** Solicita a un profesional de salud con mayor jerarquía "recordar" el número de mujeres que recibieron atención post-aborto, sea espontáneo o inducido, hospitalizado o ambulatorio, en un "mes típico".



**2. Encuesta a profesionales conocedores del tema (EPCT):** Solicita a personas diversas que especulen cuántos abortos ellos creen ocurren por cada aborto que llega a complicarse. A partir de estas opiniones, se estima un factor expansivo que multiplica la cifra estimada en la EIPS.



\* Las cifras de aborto presentadas en verde corresponden a estimaciones epidemiológicas crudas, que deben ser corregidas por diferencias en tasas reproductivas de cada país.